

## MASTERCID MICRO

Skoncentrowany środek owadobójczy i roztoczobójczy, płyn mikrokapsułkowany

Do użytku w miejscach użyteczności publicznej i w obiektach mieszkalnych.

Wyłącznie do użytku profesjonalnego

### MASTERCID MICRO

Substancje czynne:

Zawartość w 100 gramach produktu:

Cypermetyna ..... 8 g

Butotlenek piperonylu .....6 g

Tetrametryna .....2 g

### UWAGA



**Informacje o niebezpieczeństwie:** Może powodować reakcję alergiczną skóry. Podejrzewa się, że powoduje raka. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

**Środki ostrożności:** Chronić przed dziećmi - Przed użyciem przeczytać etykietę. Unikać uwolnienia do środowiska - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody z mydłem. - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. - W przypadku narażenia lub styczości: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. - - Zawartość/pojemnik usuwać do uprawnionego zakładu utylizacji odpadów. Zawiera: 1,2-benzoizotiazolin-3-on, tetrametrynę.

**Podmiot odpowiedzialny:** ORMA S.R.L. - Via U. Saba 4 - Trofarello (TO) - Tel. 011-6499064 - Siedziba prawna: Corso Matteotti, 57 - Torino, Włochy

Nr serii ... z dnia ...

Termin przydatności: 2 lata w temperaturze otoczenia

**Pojemność netto**

### OSTRZEŻENIA

Nie stosować w formie koncentratu, postępować zgodnie z zaleceniami producenta. W czasie stosowania nie zanieczyszczać żywności, napojów ani pojemników do ich przechowywania - Po użyciu i po kontakcie należy dokładnie umyć się wodą z mydłem W przypadku stosowania produktu w miejscach przedłużonego przebywania oraz w sypialniach, należy przewietrzyć takie pomieszczenie przed ponownym wejściem do niego - W przypadku zastosowania w zootechnice, wyprowadzić zwierzęta na czas stosowania produktu. Nie stosować w rolnictwie.

**PIERWSZA POMOC:** W przypadku wystąpienia niepokojących objawów skontaktować się z lekarzem

Po narażeniu drogą oddechową: Wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze, zapewnić ciepło i spokój.

W przypadku spożycia: wypłukać usta wodą. Nigdy nie podawać niczego do ust osobie nieprzytomnej. Nie wywoływać wymiotów.

## **WŁAŚCIWOŚCI**

Płyn przeznaczony do zwalczania owadów latających (muchy, komary, w tym komary tygrysie, mole spożywcze, trojszyk), biegających (karaluchy, mrówki) oraz kleszczy i roztoczy (takich jak ptaszyniec kurzy), wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Produkt przeznaczony do stosowania na powierzchniach gładkich i nienasiąkliwych.

**MASTERCID MICRO** ma zdolność eliminowania insektów obecnych w chwili stosowania produktu i zapobiegania kolejnym infestacjom przez co najmniej 2-3 tygodnie.

## **ZAKRES ZASTOSOWANIA**

**MASTERCID MICRO jest zalecany do zwalczania szerokiej gamy owadów:**

Owady latające, takie jak komary, komary tygrysie, muchy itd. Owady pełzające, takie jak karaluchy, mrówki, trojszyk itd. Ponadto działa bójczo na kleszcze i ptaszyńce kurze (*Dermanyssus Gallinae* itp.).

Skuteczność utrzymuje się przez okres 2-3 tygodni od momentu zastosowania

**MASTERCID MICRO** można z powodzeniem stosować do dezynsekcji budynków użyteczności publicznej, budynków przemysłowych, hodowlanych, domów, szkół i przedszkoli, koszar, sal gimnastycznych, teatrów, kin, poczekalni dla stacji i lotnisk, kempingów (na twardych i nienasiąkliwych powierzchniach), stołówek, restauracji, hoteli, szpitali, domów opieki, domów starości, pustych magazynów i pustych składów artykułów spożywczych, stajni, ferm zwierząt, schronisk dla zwierząt, pustych magazynów i pustych pomieszczeń do produkcji i przechowywania papierosów i tytoniu, środków transportu..

Produkt wykazuje skuteczność na poziomie 100% (w zależności od rodzaju tetowanego organizmu czas uzyskania 100% skuteczności jest różny).

-karaluchy po upływie 30 minut od zastosowania (również w przypadku produktu sezonowanego 2 i 3 tygodnie)

- komary po upływie 6 minut od zastosowania

- muchy po upływie 20-25 minut od zastosowania

- mrówki po upływie 60 minut od zastosowania

- *Plodia interpunctella* (*Omacnica spichrzanka*) po upływie 10 minut od zastosowania

- *Tribouum confusum* (*Trojszyk ulec*) po upływie 15 minut od zastosowania

- *Rhipicephalus sanguineus* (*Kleszcz psi*) po upływie 15 minut od zastosowania

- *Dermanyssus gallinae* (*Ptaszyniec kurzy*) po upływie 10 minut od aplikacji.

## **SPOSÓB UŻYCIA:**

**MASTERCID MICRO** można rozprowadzać przy użyciu pomp ciśnieniowych, ręcznych lub elektrycznych, rozpylaczy, nebulizatorów itd. w stosunku 1 litr mieszanki na 10-15 m<sup>2</sup> powierzchni.

**Pomieszczenia zamknięte:** rozpylić szczególnie na obszarach biegnących po obwodzie pomieszczeń, cokoły, kąty i szczeliny, tył mebli, kuchnie, piekarniki, lodówki, miejsca gromadzenia odpadów, w toaletach i tam wszędzie, gdzie zazwyczaj występują insekty. Zwalczając owady latające, produkt należy rozpylać na powierzchni, na których owady te zazwyczaj przebywają. W hodowlach należy uprzednio wyprowadzać zwierzęta, a następnie wywietrzyć lokale przed ich ponownym wprowadzeniem. Aplikować poza zasięgiem zwierząt.

**Na zewnątrz:** nanieść na ściany, okna, parapety, gzymsy, Aby zapobiec reinfestacji zamkniętych pomieszczeń, zalecamy zraszanie produktem całego obwodu zewnętrznego, aż na odległość 1 m, a ściany na wysokość około 1 m.

#### **DAWKI**

**Owady latające:** rozcieńczyć 5-10 ml w litrze wody (0,5-1%) w zależności od stopnia występowania insektów. Większa dawka jest zalecana do zwalczania much.

**Owady pełzające i roztocza:** rozcieńczyć w proporcjach 0,5-1% (50-100 ml w 10 litrach wody), w zależności od stopnia występowania insektów i ich rodzaju. Większa dawka jest zalecana do tępienia karaluchów. Nie przekraczać zalecanych dawek.

**MASTERCID MICRO** można także mieszać w proporcjach 3-5% z rozpuszczalnikami na bazie glikolu (300-500 ml w 10 litrach rozpuszczalnika), do stosowania w nebulizatorach (zimne mgły) lub w termonebulizatorach (ciepłe mgły), w stosunku 0,5-1 litra rozpuszczalnika na hektar powierzchni lub 0,5-2 na 1000 m<sup>3</sup> pomieszczenia.

Stosowanie **MASTERCID MICRO** ze specjalnym sprzętem (np. generatory mgły) jest dozwolone tylko dla profesjonalnych użytkowników.

Przechowywać tylko w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

Z upoważnienia Prezesa  
Barbara Jaworska-Łuczak  
Wiceprezes ds. produktów biobójczych  
/dokument podpisany elektronicznie